

CENY HURTOWE

www.e-zikoapteka.pl



15,97

PANTHENOL FORTE

spray 6%, 150 ml

średnia cena rynkowa: ~~27,80~~ zł



7,90

ALTACET

żel, 75 g

średnia cena rynkowa: ~~11,60~~ zł

Produkt złożony. Postać farmaceutyczna: żel. Skład: 1 g żelu zawiera 10 mg octanowienu glicyny. **Dawkowanie:** Zewnętrznie: stosować na bolące miejsca 3-4 razy dziennie, najlepiej w postaci okładów. **Wskazania:** Ścieranie, obrzęki stawowe i powłokowe, obrzęki spowodowane oparzeniem i stopniem. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na składniki preparatu. Nie stosować na otwarte, rozległe rany oraz w przypadku infekcji skórnych. **Podmiot odpowiedzialny:** EMO W.A.F.K. OGROSKI KSAWEROW



38,97

DIOSMINEX

500 mg, 60 tabletek

średnia cena rynkowa: ~~58,90~~ zł

Produkt złożony. Postać farmaceutyczna: tabletki. Skład: Jedna tabletkowa powłokowa zawiera substancję czynną: 500 mg zmikronizowanej oczyszczonej frakcji flawonowej w tym diosminy 450 mg, flawonoidów w przeliczeniu na hepterydynę 50 mg, substancje pomocnicze. **Dawkowanie:** zalecana dawka to 2 tabletki na dobę, w dwóch dawkach podzielonych (rano i wieczorem). **Wskazania:** Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych, uczucie ciężkości nóg, ból, mrowienie, kuczawienie. Leczenie objawowe w przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żyłkami obrotu. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku. Ciąża, okres karmienia piersią. **Podmiot odpowiedzialny:** LEK-AM SP. Z O.O. P.F.



4,49

AVIOMARIN

5 tabletek

średnia cena rynkowa: ~~5,80~~ zł

Produkt złożony. Postać farmaceutyczna: tabletki. Skład: 1 tabl. zawiera 0,05 g dimetyldiuronu. **Dawkowanie:** Dorosli doustnie zapobiegawczo 0,05 g na 30 min przed podróżą lub narkozą (dawka można podawać 3-4 razy na 24 h, ale nie częściej niż co 4 h) leczniczo 0,05 g 3-4 razy na 24 h. Dzieci w zależności od wieku 0,025-0,1 g - 2 razy dziennie. **Wskazania:** Polecany w podróży samolotem, autobusem, statkiem i statkiem. Lek stosuje się w zapobieganiu chorobom lokomocyjnym oraz w zapobieganiu i leczeniu nudności i wymiotów innego pochodzenia. **Przeciwwskazania:** Ciąża, laktacja, nadwrażliwość na lek, dzieci do lat 5, padaczka, jaskra, ostro porfiria, ostre dermatozy wysypkowe i pęcherzowe. **Podmiot odpowiedzialny:** PLIVA KRAKÓW Z.F. S.A.

ZIKOAPTEKA

ul. Aleksandry 11 • ul. Beskidzka 30 • ul. Bratysławska 2 • ul. Długa 88 • ul. Retoryka 23 • os. Jagiellońskie 19 • os. Piastów 60 • os. Urocze 1

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Oferta ważna do 31.08 lub do wyczerpania zapasów.